

FIGARO₃₆₀

KISZERELÉS
 20 L

NEM SZELEKTÍV SZISZTEMIKUS HERBICID AZ EGYÉVES ÉS ÉVELŐ GYOMOK IRTÁSÁRA

A Figaro 360 hatóanyaga a glifozát melyet a növény klorofillt tartalmazó zöld részein keresztül veszi fel. A hatóanyag innen transzlokálódik a gyökerekbe, tarackokba, rizómákba. A tünetek 1-2 hét után jelentkeznek öregedésben, törpe növésben, levél és hajtásbarnulásban. A folyamat visszafordíthatatlan, a kezelt növény elpusztul. Mivel a glifozátok a növényben való mozgása során a szaporító képletekbe is eljut, hatása az évelők esetében is a növény pusztulásához, vagy maradandó károsodásához vezet. Hatása ennek megfelelően a választott dózis függvényében kiterjed mind a magról kelő, mind az évelő egy- és kétszikűekre.

TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag

360 g/l glifozát

Hatóanyag csoport

HRAC „G”, glicinek hatóanyagcsoport

Formuláció

vízoldható folyadék (SL)

Engedélyszám

04.2/709-1/2017. NÉBIH

Eltarthatóság

2 év eredeti csomagolásban



Kultúra	Károsító (cél)	Kezelés ideje	Kezelések maximális száma	Kezelések közti min. idő (nap)	Szer (l/ha)	Víz (l/ha)	É.V.I. (nap)
Szántóföld	magról kelő egy- és kétszikű gyomok Évelő egy- és kétszikű gyomok	vetés előtt, ill. után a csírázás megindulásáig	2	60	2,0-3,0 4,0-6,0	150-300	n.k.
Tarló	magról kelő egy- és kétszikű gyomok Évelő egy- és kétszikű gyomok	a gyomnövények intenzív növekedésekor	2	60	2,0-3,0 4,0-6,0	150-300	n.k.
Mezőgazdasá-gilag nem művelt területek, csatornák, árokpartok, vasúti pályatestek	totális gyom- és cserjeirtás	a gyomnövények intenzív növekedésekor	2	60	5,0-7,0	250-300	n.k.
Házi kertek, temetők	magról kelő egy- és kétszikű gyomok Évelő egy- és kétszikű gyomok	a gyomnövények intenzív növekedésekor	2	60	2,0-3,0 4,0-6,0	250-300	n.k.
Közterületek (kivéve játszótérek)	magról kelő egy- és kétszikű gyomok Évelő egy- és kétszikű gyomok	a gyomnövények intenzív növekedésekor	2	60	2,0-3,0 4,0-6,0	250-300	n.k.
Legelő, gyepek	totális gyomirtás	a gyepek feltörését megelőzően	2	60	4,0-6,0	250-300	n.k.
Lucerna	aranka	kaszálást követő 5-7 nap múlva	2	60	0,5-0,7 ill. 0,2-0,3 %	150-250	n.k.
Erdészet összes faj (erdőtelepítés előtt)	totális gyom- és cserjeirtás	telepítés előtt 1-2 héttel	1	-	3,0-5,0	250-300	n.k.
Erdészet luc-, erdei-, duglászfenyő	totális gyom- és cserjeirtás	telepítés után 2 évvel	1	-	3,0-5,0	250-300	n.k.
Erdészet luc-, erdei-, duglászfenyő (2 évesnél idősebb)	totális gyom- és cserjeirtás	2 évnél idősebb telepítésekben	1	-	3,0-5,0	250-300	n.k.
Erdészet fakitermelés	sarjhajtások	sarjhajtások ellen	2	60	3,5 % töménységben	300-400	n.k.
Szőlő (min. 3 éves)	magról kelő egy- és kétszikű gyomok évelő egy- és kétszikű gyomok	hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után	2	60	2,0-3,0 4,0-6,0	150-200	n.k.
Almatermésűek (min. 3 éves)	magról kelő egy- és kétszikű gyomok évelő egy- és kétszikű gyomok	hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után	2	60	2,0-3,0 4,0-6,0	150-200	n.k.
Csonthéjasok (min. 3 éves)	magról kelő egy- és kétszikű gyomok évelő egy- és kétszikű gyomok	hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után	2	60	2,0-3,0 4,0-6,0	150-200	n.k.

Kultúra	Károsító (cél)	Kezelés ideje	Kezelések maximális száma	Kezelések közti min. idő (nap)	Szer (l/ha)	Víz (l/ha)	É.V.I. (nap)
Héjas gyümölcsűek (min. 3 éves)	magról kelő egy- és kétszikű gyomok évelő egy- és kétszikű gyomok	hajtásnövekedés kezdetéig, szüret után	2	60	2,0-3,0 4,0-6,0	150-200	n.k.
Őszi búza	évelő egy- és kétszikű gyomok	2 héttel betakarítás előtt	1	-	4,0-6,0	150-250	14
Őszi és tavaszi árpa	évelő egy- és kétszikű gyomok	2 héttel betakarítás előtt	1	-	4,0-6,0	150-250	14
Kukorica (takarmány)	állományszárítás	30-40 % nedvesség-tartalomnál	1	-	2,0-5,0	50-60 (légi) 150-250 (földi)	14
Napraforgó	állományszárítás	20-30 % nedvesség-tartalomnál	1	-	2,0-5,0	50-60 (légi) 150-250 (földi)	10 nap - max.2 L/ha dózis alkalmazása esetén 14 nap - max.5 L/ha dózis alkalmazása esetén
Repce	állományszárítás	60% magbarnulásnál	1	-	4,0	150-250	10
Szója	állományszárítás	30 % nedvesség-tartalomnál	1	-	3,0-5,0	150-250	10 nap -3 L/ha dózis alkalmazása esetén) 14 nap -5 L/ha dózis alkalmazása esetén

n.k.: Ezen kultúrák esetében élelmezés-egészségügyi várakozási idő előírása nem szükséges, amennyiben a növényvédelmi technológia az engedélyokiratban előírtak szerint történik.

Munkaegészségügyi várakozási ideje:
Forgalmazási kategória:
Légi kijuttatás:

0 nap
III. forgalmi kategória
kizárólag napraforgóban és kukoricában, legalább 10 ha összefüggő táblaméret esetén, a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítő adalékanyag kötelező hozzáadásával és elsodródás-gátló szórófej alkalmazásával.

Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a termék címkéjén található használati utasítást!

„A Figaro 360 azonos a 04.2/5211-1/2015. NÉBIH számon engedélyezett Barclay Gallup Biograde 360 gyomirtó permetezőszerszettel.”

