

TRIDUS®

NÖVEKEDÉS-SZABÁLYOZÓ KÉSZÍTMÉNY KALÁSZOSOKBAN

A TRIDUS hatóanyaga a ciklohexandionok közé tartozik, ami a növényi szövetekben fellépő megnyúlásért felelős gibberellinre hat. A készítmény blokkolja az aktív gibberellin képződést, így a szár internódiáinak megnyúlása leáll. A kezelt növények szára rövidebb lesz, a szár sejteinek falai vastagabbak és erősebbek. A TRIDUS-t a növekedés korai fázisaiban kell alkalmazni a megdőlés megelőzése érdekében. A készítmény pozitívan hat a gyökérrendszer fejlődésére is, így a növények jobban rögzülnek a talajban, intenzívebbé válik a víz- és tápanyagfelvétel, ami végül pozitívan hathat a termés mennyiségére és minőségére.

TERMÉK INFORMÁCIÓ

Hatóanyag

250 g/l trinexapak-etil

Formuláció

emulzióképző koncentrátum (EC)

Engedélyszám

04.2/143-2/2015 NÉBIH

Eltarthatóság

2 év eredeti csomagolásban



KISZERELÉS



5 L

Kultúra	Szer (l/ha)	Víz (l/ha)	Kezelés időpontja (fenológiai állapot szerint)
Őszi árpa	0,4 - 0,6	200 - 300	BBCH 30-32 Szárba indulás – két szárcsomós állapot BBCH 37-39 Zászlóslével megjelenése – nyelvecske állapot, kiterült zászlóslével
Tavaszi árpa	0,5	200 - 300	BBCH 30-32 Szárba indulás – két szárcsomós állapot
Őszi búza	0,4	200 - 300	BBCH 30-39 Szárba indulás – nyelvecske állapot, kiterült zászlóslével
Tavaszi búza	0,4	200 - 300	BBCH 31-32 egy szárcsomós állapot – két szárcsomós állapot
Tritikálé, durumbúza, rozs, zab	0,4	200 - 300	BBCH 30-32 Szárba indulás – két szárcsomós állapot
Gyep (vetőmag)	0,8	200 - 300	BBCH 30-31 Szárba indulás – egy szárcsomós állapot

A készítmény kijuttatása kalászosokban az alábbiak szerint lehetséges:

- őszi árpa: a kultúrnövények szárbaindulásától (BBCH 30) két szárcsomós állapotig terjedő időszakban (BBCH 32) 0,4 l/ha mennyiségben, vagy a zászlóslével megjelenésétől (BBCH 37) a zászlóslével kiterüléséig terjedő időszakban (BBCH 39) 0,6 l/ha mennyiségben, állománypermetezéssel, de a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijuttatva
- tavaszi árpa: a kultúrnövények szárbaindulásától (BBCH 30) két szárcsomós állapotig terjedő időszakban (BBCH 32) 0,5 l/ha mennyiségben, állománypermetezéssel, a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijuttatva
- őszi búza: a kultúrnövények szárbaindulásától (BBCH 30) a zászlóslével kiterüléséig terjedő időszakban (BBCH 39) 0,4 l/ha mennyiségben, állománypermetezéssel, a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijuttatva
- tavaszi búza: a kultúrnövények egy szárcsomós állapotától (BBCH 31) két szárcsomós állapotig terjedő időszakban (BBCH 32) 0,4 l/ha mennyiségben, állománypermetezéssel, a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijuttatva
- tritikálé, durumbúza, rozs, zab: a kultúrnövények szárbaindulásától (BBCH 30) két szárcsomós állapotig terjedő időszakban (BBCH 32) 0,4 l/ha mennyiségben, állománypermetezéssel, a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijuttatva
- gyep (vetőmag előállítás): a kultúrnövények szárbaindulásától (BBCH 30) egy szárcsomós állapotig terjedő időszakban (BBCH 31) 0,8 l/ha mennyiségben, állománypermetezéssel, a tenyészidőszak során legfeljebb egy alkalommal kijuttatva

A készítmény egy vegetációs időszakban legfeljebb egy alkalommal használható!

A készítmény nem használható legeltetésre, vagy takarmánytermesztés céljából fenntartott gyep állományban!

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: Az előírt növényvédelmi technológia betartása esetén megadása nem szükséges

Munkaegészségügyi várakozási ideje: 0 nap

Forgalmazási kategória: II. forgalmi kategória

Légi kijuttatás: Nem engedélyezett